[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl7

A61K 35/78 A61K 35/02 A61P 7/04

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 94107005.0

[45]授权公告日 2000年4月12日

[11]授权公告号 CN 1051236C

[22]申请日 1994.6.6 [24]銀证日 2000.3.3

[21]申请号 94107005.0

[73]专利权人 郭文峰

地址 710061 陕西省西安市 70 号信箱

[72]发明人 郭文峰

[56]参考文献

<<中药大辞典>>第一版 1986. 5.30 江苏新医学院编,上海科技出版社出版

<<陕西中医>>1987,8(4) 1987. 3.30 吕兰黨, 止血中药的研究动态

审查员 宋江秀

[74]专利代理机构 咸阳市专利事务所 代理人 康志安

权利要求书1页 说明书2页 附图页数0页

[54]发明名称 止血散

[57]摘要

本发明给出了一种用于止血的中药药物止血散。它是选用中药药物花蕊石、白 芨、三七粉和芦甘石为原料,先将花蕊石、芦甘石分别经火煅、醋淬、研沫和 水飞,再将白芨经焙干、研沫和过筛,然后再将上述选料与三七粉混合均匀,再经消毒后而成。其各选料的重量比例是花蕊石:白芨:三七粉:芦甘石=40:30:20:10。它对内外伤痛有着显著的止血和止痛作用。

权 利 要 求 书

1、一种用于止血的中药药物止血散, 其特征在于它是选用中药药材 花蕊石、白芨、三七粉和芦甘石做原料, 先将花蕊石、芦甘石分别经火煅、 醋淬、研末和水飞, 再将白芨经焙干、研末和用800目的缔过缔, 然后再 将上述选料与三七粉混合均匀再经消毒后而获得, 其各选料的重量比例是 花蕊石:白芨:三七粉:芦甘石=40:30:20:10。

止血散

本发明涉及一种用于止血的中药药物止血散。

目前市面上用于止血的中药药物以《云南白药》为代表,该 药自投放市场以来常盛不衰,其原因是疗效较好,携带使用方便, 适用于一般的外伤和少量内出血,而对于出血量大的内外伤使用 效果不佳。

本发明的目的在于提供一种疗效迅速,用于大型内外伤的止血中药药物止血散。

本发明是选用了止血止痛,消肿生肌,化瘀解毒,收湿敛疮的中药药物,以花蕊石为主药,以白芨为副药,以三七粉为佐药,以芦甘石为使药,先将花蕊石,芦甘石分别经火煅、醋淬、研沫和水飞,再将白芨经焙干,研细和过筛,然后再将上述选料与三七粉混合均匀,再经消毒后而成,其各选料的重量比例是花蕊石:白芨:三七粉:芦甘石=40:80:20:10。

本发明的优点在于它有良好的局部止血作用,能使血细胞凝集,形成人工血栓,促使疮面肉芽组织的生长及愈合。内服能促进血中钙离子浓度升高,使血管和淋巴结致密,防止血浆渗出,促进血液凝固。外用可迅速止血,能部分溶断和吸收疮面渗出物,有收敛保护伤口的作用,止血快,结痂快,不感染,不怕水浸汗渍,并无毒副作用。

下面以实施例对本发明进一步说明:

本发明选用中药材花蕊石、白芨、三七粉和芦甘石做为原料,先将花蕊石、芦甘石分别经火煅、醋淬、研沫和水飞,再将白芨经焙干、研沫和用800目的筛过筛后,然后再将上述选料与

三七粉混合均匀,再经用紫外线消毒1小时而成。其各选料的重量比例是花蕊石:白芨:三七粉:芦甘石=40:30:20:10。